

آمادگی جهت رکتوسیگموئیدسکوپی

داروهای مورد نیاز: ۳ عدد شیاف بیزاکودیل ۱۰ میلی گرم

- عصر روز قبل از انجام رکتوسیگموئیدسکوپی، سوپ ساده بدون نان و بدون برنج میل شود.
- عصر روز قبل از رکتوسیگموئیدسکوپی یک عدد شیاف بیزاکودیل و شب قبل از انجام رکتوسیگموئیدسکوپی یک عدد شیاف بیزاکودیل استفاده شود.
- از ساعت ۱۲ شب قبل از رکتوسیگموئیدسکوپی ناشتا شوید.
- مصرف تمامی داروها روز قبل از انجام کار بلامانع است.
- در صورت داشتن دیابت و مصرف دارو، روز انجام کار مصرف این داروها ممنوع است.
- در صورت داشتن داروهای کنترل فشار خون و ضربان قلب در وعده صبح، میتوانید با کمی آب ساعت ۶ صبح قبل از مراجعه به بیمارستان مصرف نمایید.
- داشتن یک نفر همراه الزامی است.
- حداقل یکی از ناخن ها بدون لاک باشد.
- رانندگی روز انجام کار ممنوع است.
- در صورت داشتن بیمه تکمیلی، منشی واحد را در جریان قرار دهید.
- اولویت با بیماران بستری در بیمارستان است.

تلفن واحد اسکوپ: ۲۳۹۲۲۴۶۶

با آرزوی سلامتی