

آمادگی های لازم جهت انجام برونکوسکوپی

جهت انجام برونکوسکوپی پس از ویزیت توسط پزشکان ریه اطلاع به سرویس پزشک داخلی قلب با واحد اسپیرومتری هماهنگ می گردد:

۱. برقراری یک راه وریدی سالم.
۲. ناشتا بودن بیمار به مدت ۶ ساعت.
۳. چک آزمایشات انعقادی، کراتنین و هماتولوژی.
۴. قطع داروهای ضد انعقادی با نظر سرویس مربوطه.
۵. توضیح دادن به بیمار و اخذ رضایت آگاهانه توسط سرویس مربوطه.
۶. اطلاع به پزشک و پرستار در صورت ابتلا به مشکلات قلبی و یا عروقی یا صرع و تشنج در سه ماهه اخیر.
۷. به همراه آوردن یک نفر آگاه به شرایط بیمار.

مراقبت های بعد از انجام پروسیجر:

۱. بیمار به مدت ۲ ساعت ناشتا باشد.
۲. سر بیمار در وضعیت ۴۵ درجه قرار داشته باشد.
۳. بیمار از نظر وضعیت هوشیاری مورد بررسی قرار گیرد و از رانندگی پرهیز کند تا اثر داروی بیهوشی از بین برود.

با آرزوی سلامتی